

VIII. *A list of the Hemiptera-Heteroptera collected by Mr. Champion in Corsica in June, 1893, with a description of one new species.* By EDWARD SAUNDERS, F.L.S.

[Read Feb. 28th, 1894.]

Odontoscelis fuliginosa, Linn., Ajaccio.

Odontotarsus grammicus, Linn., Vivario and Vizzavona. (2500—4000 ft.)

Eurygaster maura, Linn., Vizzavona.

Ancyrosoma albolineatum, Fab., Ajaccio, Vizzavona.

Graphrosoma lineatum, Linn., Ajaccio, Vizzavona.

Brachypelta aterrima, Foerst., Corte.

Sciocoris sulcatus, Fieb., Corte, Bocognano.

Dryoderes marginatus, Fab., Corte.

Ælia acuminata, Linn., Vizzavona, Vivario.

Peribalus vernalis, Wolff, Corte.

Carpocoris fuscispinus, Boh., Vizzavona, Ajaccio.

Palomena viridissima, Pod., Vizzavona.

Pentaloma juniperina, Linn., Bocognano.

Piezodorus incarnatus, Germ., Bocognano and Vizzavona.

Rhaphigaster grisea, Fab., Ajaccio.

Eurydema ornatum, L., Corte.

„ *decoratum*, H.-S., Corte, Vizzavona, Ajaccio.

„ *pictum*, H.-S., Ajaccio.

„ *oleraceum*, Linn., Vizzavona.

Elasmostethus interstinctus, Linn., Vizzavona.

Spathocera lobata, H.-S., Bocognano, Vizzavona.

Centrocoris spiniger, Fab., Bocognano, Vizzavona.

Syromastes marginatus, Linn., Corte, Vizzavona.

Verlusia rhombea, Linn., Ajaccio, Bocognano, Vizzavona.

„ *sulcicornis*, Fab., Bocognano.

Gonocerus insidiator, Fab., Bocognano.

Ceraleptus squalidus, Costa, Vizzavona.

Loxocnemis dentator, Fab., Vivario.

Coreus affinis, H.-S., Bocognano, Corte, Vizzavona.

„ *denticulatus*, Scop., Corte, Vizzavona.

Strobilotoma typhaeornis, Fab., Corte and Vizzavona.

TRANS. ENT. SOC. LOND. 1894.—PART I. (MARCH.)

Camptopus lateralis, Germ., Vizzavona, Ajaccio.

Therapha hyoscyami, Linn., Bocognano, Vizzavona.

Corizus crassicornis, Linn., " " Vivario.

" *capitatus*, Fab., Vizzavona.

" *parumpunctatus*, Schil., Vizzavona and Bocognano.

Megalomerium merulionale, Costa, Ajaccio.

Lyæus militaris, Fab., Ajaccio, Corte, Bocognano, Vizzavona.

" *equestris*, Linn., Vizzavona.

" *saxatilis*, Scop., " "

" *apuanus*, Rossi, " "

Lyygavosoma reticulatum, H.-S., Vizzavona, Vivario.

Nysius thymi, Wolff, Bocognano.

Cymus melanocephalus, Fieb., Ajaccio, Vizzavona.

Ischnorhynchus geminatus, Fieb., Vizzavona.

Geocoris lineola, Ramb., Ajaccio.

Heterogaster affinis, H.-S., Vizzavona.

Microplax interrupta, Fieb., Vizzavona.

" *albofasciata*, Costa, "

Metopoplax ditomoides, Costa, Vizzavona.

Macroplax fasciata, H.-S., Bocognano, Ajaccio, Vizzavona, Vivario.

Rhyparochromus prætextatus, H.-S., Vizzavona.

Stygnus pedestris, Fall., Corte.

Peritrechus geniculatus, Hahn, Vizzavona.

Trapezonotus agrestis, Fall., Vizzavona, Vivario.

Calyptonotus rolandri, Linn., Ajaccio.

Aphanus inarimensis, Costa, Bocognano, Vizzavona.

" *douglasi*, Fieb., Vizzavona.*

Beosus erythropterus, Brullé, Vizzavona, Corte.
 „ *luscus*, Fab., Corte.

Eremocoris fraternus, Horv. (?), Vizzavona.
Scolopostethus cognatus, Fieb., Vizzavona and Bocognano.

Gastrodes ferrugineus, Linn., Vizzavona.

Pyrrhocoris apterus, Linn., Ajaccio.

Serenthia lata, Fall., Vizzavona.

Monanthia cardui, Linn., Ajaccio, Corte, Vizzavona.
 „ „ *cognata*, Fieb., Vivario.*
 „ „ *auriculata*, Costa, var. (?), Vizzavona,
 Corte.
 „ *angustata*, H.-S., Bocognano.
 „ *wolfii*, Fieb., Bocognano, Ajaccio, Corte.
 „ *nassata*, Put., Ajaccio.

Aradus cinnamomeus, Panz., Vizzavona, Bocognano.
 „ *krueperi*, Reut., Vizzavona.
 „ *varius*, Fab., Vizzavona.
 „ *depressus*, Fab., Vizzavona.

Gerris najas, De Geer, Vizzavona.
 „ *thoracica*, Schum., Vizzavona.
 „ *gibbifera*, Schum., Corte.

Harpactor erythropus, Linn., Ajaccio, Corte, Vivario,
 Vizzavona.
 „ *iracundus*, Poda, Corte.

Coranus ægyptius, F., Ajaccio.

Nabis lativentris, Boh., Corte, Vizzavona.
 „ *rugosus*, Linn., Vizzavona.
 „ *ferus*, Linn., Vizzavona.

Salda cocksii, Curt., var. *geminata*, Corte.

Piezostethus obliquus, Cost., Ajaccio.
Scoloposcelis angusta, Reut., Vizzavona.
Elatophilus nigricornis, Zett., „
Anthocoris confusus, Reut., „
Triphleps nigra, Wolff, Ajaccio.
 „ *horvathi*, Reut. (?), Corte.

Miris laevigatus, Linn., Vizzavona.

Lopus lineolatus, Brullé, Vizzavona.

„ *mat*, Rossi, Vizzavona.

Phytocoris femoralis, Fieb., Bocognano.

Calocoris vandalicus, Rossi, Corte.

„ *sexpunctatus*, Fab., Ajaccio, Vizzavona,
Corte.

„ *bipunctatus*, Fab., Bocognano, Vizzavona,
Corte.

„ *trivialis*, Cost., Bocognano.

„ *ventralis*, Reut., Corte.

Lygus pratensis, Fab., Vizzavona.

„ *pastinacæ*, Fall., Vizzavona, Ajaccio.

„ *cervinus*, H.-S., „

Pœciloscytus gyllenhalii, Fall., Corte.

Camptobrochis punctulata, Fall., Vizzavona, Bocognano.

Capsus laniarius, Linn., Corte.

Pilophorus cinnamopterus, Kb., Bocognano, Ajaccio.

Strongylocoris obscurus, Ramb., Bocognano.

Orthocephalus championi, Saund.*

(See description at the end of the list.)

Dicyphus hyalinipennis, Klug, Ajaccio.

„ *geniculatus*, Fieb., Bocognano.

Globiceps sphegiformis, Rossi, Corte.

Heterotoma diversipes, Put., Corte, Ajaccio.

Placochilus seladonicus, Fall., Ajaccio.

Pachyxyphus linellus, M. & R., Corte, Vizzavona.

Macrotylus longirostris, Fieb., Bocognano.

Psallus mollis, M. & R., Vizzavona, Bocognano.

„ *anchorifer*, Fieb., Bocognano, Ajaccio.

Criocoris crassicornis, Hahn, Corte.

Corixa semistriata, Fieb., Vizzavona.

Orthocephalus championi, sp. n.

Piceo-niger nitidiusculus, lœvis, pilis nigris, pilisque squamiformibus albis, facillime divellendis, vestitus ; capite transverso, oculis rotundatis, prominulis, vertice inter eos quam oculo (δ) fere duplo, (φ) duplo et dimidio latiore, postice acute carinato, antennis pilosulis, articulis primo et secundo incrassatis, testaceis, hoc versus apicem piceo nigro, duobus sequentibus simul sumptis longiore, maris lateribus subparallelis, feminæ fusiforme ; tertio quartoque filiformibus, tertio basi testaceo, quarto duplo longiore ; prothorace lœvi, trapezoidale, planiusculo, angulis anticis rotundatis, lateribus rectis, callis discretis ; scutello lœvi ; hemielytris (δ) corio interne plus minus late pallido-testaceo, membrana infumata, venis nigropiceis, basi areolisque pallidis, (φ brach.) abdomine brevioribus, apicibus oblique truncatis, corio margine interno basi arcte pallido ; pedibus testaceis, femoribus piceo nebulosis, tibiis nigro punctatis, setis spiniformibus ornatis ; subtus nigropilosus et albo squamiger.

Long.: δ 4½ mm., φ 4 mm.

Hab. Bocognano, Corsica, on aromatic plants.

This is a beautiful addition to the European fauna, which I have pleasure in naming after its discoverer. I have sent examples of it to Dr. Reuter, who has kindly examined them, and agrees in considering them as belonging to an undescribed species allied to *bivittatus*, Fieb., though at once distinguishable by the form, etc., of the antennæ.